

Therapie der Entgiftungsstörung

Therapiestart
mit Unterstützung der Phase III

Zur Bindung der fettlöslichen
Gifte im Darm und zur Vermeidung
einer Rückresorption:

Bio-Chlorella-Algen

3 x 10-30 Presslinge zur Mahlzeit

Zur Unterstützung des Gifttransports
über die Galle:

Taurin 3 x 0,5-1g

Bio-Chanca Piedra 2 x 2g

1 Monate nach Therapiestart
mit Bio-Chlorella und Taurin kann nun mit der
Unterstützung der Phase II begonnen werden.

Therapiefortsetzung
mit Unterstützung der Phase II

Zur Bindung der hochtoxischen
Stoffe und zur intrazellulären
Glutathionerhöhung stehen
folgende Produkte zur Verfügung:

Glycin 3 x 0,5-1g

MSM 3 x 2-3g

Taurin 3 x 0,5-1g

Glutamin 2 x 2g

R-Alpha-Liponsäure 1-2 x 200mg
zusammen mit Bio-Chlorella verzehren.

Nach einem weiteren Monat
kann nun mit der Unterstützung
der Phase I gestartet werden.

Therapievollständigung
mit Unterstützung der Phase I

Zur Aktivierung der Phase I
stehen folgende Produkte
zur Verfügung:

P-5'-P (aktiviertes Vitamin B6)

bzw. **B-Komplex aktiviert**

Zink

Magnesium

zusammen mit Bio-Chlorella verzehren.

Die Dosierung ist individuell, je nach Grad der
zugrunde liegenden Entgiftungsstörungen
und Mangelzustände, vorzunehmen.

Therapiedauer 6-18 Monate, je nach Schweregrad
der Vergiftung und der Entgiftungsstörung.

hauer Naturprodukte

Ein intaktes Entgiftungssystem

ist die Basis

für den Erfolg

jeder weiteren Therapie



hauer Naturprodukte ~ www.hauer-naturprodukte.com

Inh: Christian Hauer ~ Schulstraße 5 ~ 25557 Thaden ~ Tel. 04872-942782 ~ Fax. 04872-942781 ~ info@hauer-naturprodukte.com

Die drei Phasen der körpereigenen Zellentgiftung

Störung der Zellentgiftung

